

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مرکز آموزشی و درمانی قطب الدین

عنوان فرایند: تهیه و تزریق ایمنوگلوبولین وریدی (IVIG) (بعد از ارتقا)


مدت انجام فرایند: ۱ تا ۲ ساعت

صاحب فرایند: بخش ICU

تاریخ تدوین: ۹۲/۷/۳

تاریخ بازنگری اول: ۹۳/۷/۳

تاریخ بازنگری دوم: ۹۴/۷/۳



• تزریق داروی IVIG در ابتدا بصورت آهسته می باشد. (وجود حساسیت در بیمار)- تزریق هر ویال IVIG نیاز به ۲۰ الی ۳۰ دقیقه زمان دارد

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مرکز آموزشی و درمانی قطب الدین

عنوان فرایند: تهیه و تزریق ایمونوگلوبولین وریدی (بعد از ارتقا) IVIG

مدت انجام فرایند: ۱ تا ۲ ساعت

صاحب فرایند: بخش ICU

تاریخ تدوین: ۹۲/۷/۳

تاریخ بازنگری اول: ۹۳/۷/۳

تاریخ بازنگری دوم: ۹۴/۷/۳